

Salátafélék

fajta- és technológiai
ajánlat
2024-2025



syngenta



Tisztelt Partnerünk!

Örömmel mutatjuk be új saláta katalógusunkat, mely a bevált, magyarországi klímára és piaci igényekre szelektált fajtáinkat tartalmazza.

Az elmúlt években a Syngenta salátafajták bebizonyították hogy helyük van a hazai saláta piacon, amelyet jó termeszthetőségüknek és magas ellenállóságuknak köszönhetnek.

Az új peronoszpóra törzsek megjelenése idén sem állt meg, amit a magyar kertész kollegák is meg tapasztalhattak. Három új, a BI:38EU, BI:39EU és BI:40EU rassz-t izoláltak, melyek Európa szerte különböző mértékben okoztak problémát. A BI:38EU törzset megtalálták Portugáliába, Franciaországban, Svájcban, Németországban, Spanyolországban és hazánkban is. A BI:39EU és BI:40EU törzset is több európai országban izolálták, ezért ezekre is figyelmet kell fordítanunk a közeljövőben.

A fejes saláta szortimentünk fajtái, mint a hajtatási **Singapore** vagy a szabadföldi tavaszi, őszi termesztésre javasolt **Petrian** és **Karmian**, illetve a nyári termesztésre javasolt **Sappian** mindegyike teljes peronoszpóra ellenállósági sorral rendelkezik, tehát BI:29-40EU ellenállóak, melynek tudatában biztonsággal termeszthetjük őket hazánkban is.

Jégsalátáink közül teljes peronoszpóra ellenállósággal az **Ice Wave** rendelkezik! Azon kertész kollegáknak, akik a fuzáriumos fertőzés 4-es rasszával küzdenek, megoldást jelenthet tavaszi termesztésben az **Ice Pop**, nyári termesztésben pedig az **Ice Music** fajtánk. Tartjuk magunkat hagyományainkhoz és nem csak vetőmag/fajta ajánlattal kívánjuk segíteni partnereinket, így kiadványunk most is tartalmazza a Malagrow Kft. technológiai ajánlatát, illetve a Syngenta legújabb növényvédőszer javaslatait is.

**Megújult zöldségvetőmag
weblapunkon folyamatosan frissülő híreket,
információkat olvashat és
a teljes fajtaválasztékunkat
megtalálja.**

Olvassa be a QR kódot, amely közvetlenül az oldalunkra visz!

**Olvassa be
a QR-kódot!**



- Vajfej saláta őszi, kora tavaszi hajtására.
- Világos zöld színű, igazi „szőke” saláta.
- Fényszegény időszakban is jól fejlődik.
- Betegségellenállósága magas, a jelenleg legmagasabb peronoszpóra ellenállósággal rendelkezik.
- Szeptember közepétől március elejéig javasoljuk ültetését.
- Rezisztencia: HR: BI: 29-40EU



- Sötétzöld levélszínű, hajtatási fejes saláta.
- Őszi, kora tavaszi hajtásra javasolt, főleg áruházi beszállításra.
- Fényszegény időszakot jól tolerálja.
- Jó pultállósággal rendelkezik.
- Szeptember közepétől március elejéig ültethető.
- Rezisztencia: HR: BI: 29-37-39EU

Hajtatási fejes saláták javasolt ültetési idők:

[illegible]Ültetési idő:

További sikeres termesztés kívánunk!

Rádi László Zsolt
Káposzta és salátafélék termékmenedzser

Fóris Balázs
Leveles zöldségek, hagymafélék specialista

- Szabadföldre, tavaszi és őszi időszakra javasolt fejes saláta.
- Levélvastagságának köszönhetően jó pultálló.
- Középzöld színnel rendelkezik.
- Betegségellenállósága magas, széles peronoszpóróra rezisztenciával rendelkezik.
- Stressztoleranciája kiemelkedő, ezért a termelők kedvence lehet.
- Levélszélbarnulásra nem érzékeny.
- Tavasszal március elejétől április végéig, ősszel augusztus közepétől szeptember közepéig ültethető.
- Rezisztencia: HR: Bl:29-40/Nr:0 IR: LMV:1



Karmian

- Tavasz, őszi termesztésre ajánlott szabadföldi fajta.
- Színe középzöld, a piac által kedvelt levélstruktúrával rendelkezik.
- A fajta gyorsasága teszi kiemelkedővé fajtatársaihoz képest.
- Fuzáriummal 1. rasszával szembeni toleranciával rendelkezik.
- Tavasszal március közepétől április végéig, ősszel augusztus közepétől szeptember közepéig ültethető
- Rezisztencia: HR: Bl:29-40 EU, Nr:0 IR: LMV:1, Fol:1



- Nyári természetésre ajánlott
fejes saláta.
- Az elmúlt évek extrém nyári melegeiben
már bizonyított.
- Gyors fajta, korán fejesedik.
- Színe középzöld, levélvastagsága
jó pultállóvá teszi.
- Súlyos fejeket képez.
- Rezisztencia: HR: Bl: 29-40EU Nr:0,
TBSV IR: LMV:1



Szabadszabócska fejes saláták javasolt ültetési idők:

[illegible]

Ültetési idő: 1



Ice Wave

- Megbízható jégsaláta, tavaszi és őszi termesztésre.
- Peronoszpóra ellenállósága a jelenleg ismert összes rasszra kiterjed.
- Közepesen lapított fejalakú.
- Friss piac és feldolgozóipar számára egyaránt termelhető.
- Ültetése tavasszal a 13-17. hétig, ősszel a 32-35. hétig javasolt.
- Rezisztencia: HR: Bl:29-40 EU, Nr:0, TBSV



Ice Party

- Legnagyobb testű jégsalátánk.
- Termesztetését szabadföldön késő tavaszi, és őszi időszakra javasoljuk.
- Magas stressztűrő képessége miatt kedvelt.
- Nagy termőképessége miatt termesztése ipari célra javasolt.
- Rezisztencia: HR: Bl:29-37,40 EU, Nr:0, TBSV IR: Fol4



Ice Pop

- Levélszélbarnulásnak, magszárképződésnek jól ellenáll.
- Jól tervezhető, megbízható fajta.
- Tavaszra 12-20. hétig, őszi időszakra 32-35. héten ültethető.
- Ellenálló a fuzárium 4. rasszával szemben.
- Rezisztencia: HR: Bl:29-39 EU, Nr:0, TBSV, Fol4



Ice Music

- Nyári termesztésre javasolt jégsaláta.
- Magas ellenállósággal rendelkezik, magszárképződésre nem érzékeny.
- Szép, egészséges aljzattal bíró fajta.
- Közepes méretű saláta, mind friss piaci, mind feldolgozási célra.
- Ellenálló a fuzárium 4. rasszával szemben.
- Rezisztencia: HR: Bl:29-39 EU, Nr:0, TBSV, Fol4



Jégsaláták javasolt ültetési idői:

Fajta	Január				Február				Március				Április				Május				Június				Július				Augusztus				Szeptember				Október				November				December							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 Ice Wave																																																				
 Ice Pop																																																				
 Ice Party																																																				
 Ice Music																																																				

Ültetési idő: ■


SZÍNES SALÁTÁK, KÜLÖNLEGESSÉGEK



- Frizé típusú batávia.
- Súlyos fejeket képez, alakját jól tartja.
- Könnyen termelhető még nyáron is.
- Rezisztencia: HR: BI: 16-35,
37 EU, Nr: 0, IR: LMV:1



- Piros frizé típusú saláta.
- Stabilan termelhető késő tavasztól kora őszig.
- Nagy tömeget adó, mutatós saláta.
- Rezisztencia:
HR: Bl:16-37 EU,
Nr:0, TBSV



Színes saláták javasolt ültetési idők:

[illegible]Ültetési idő: 

- Közepes méretű római saláta.
- Rezisztenciája magas, fuzárium elleni toleranciával is rendelkezik.
- Tömör, kompakt fajta.
- Rezisztencia: HR: Bt:16-37 EU, Nr:0. TBSV IR: Fol:1



Római saláták javasolt ültetési időik:

Fajta																																																				
	1																																																			
	2																																																			
	3																																																			
	4																																																			
	5																																																			
	Január	6																																																		
		7																																																		
		8																																																		
	Február	9																																																		
		10																																																		
		11																																																		
	Március	12																																																		
		13																																																		
		14																																																		
		15																																																		
	Április	16																																																		
		17																																																		
		18																																																		
		19																																																		
	Május	20																																																		
		21																																																		
		22																																																		
		23																																																		
	Június	24																																																		
		25																																																		
		26																																																		
		27																																																		
	Július	28																																																		
		29																																																		
		30																																																		
		31																																																		
	Augusztus	32																																																		
		33																																																		
		34																																																		
		35																																																		
	Szeptember	36																																																		
		37																																																		
		38																																																		
		39																																																		
	Október	40																																																		
		41																																																		
		42																																																		
		43																																																		
	November	44																																																		
		45																																																		
		46																																																		
		47																																																		
	December	48																																																		
		49																																																		
		50																																																		
		51																																																		

Ültetési idő:

REZISZTENCIA JELÖLÉSEK:

BI: Saláta peronoszpóra / *Bremia lactucae*

Nr: Saláta levéltetű / *Nasonovia ribisnigri*

LMV: Saláta mozaik vírus / *Lettuce Mosaic Virus*

TBSV: Tomato Bushy Stunt Virus

Fol: Fuzáriumos hervadás / *Fusarium oxysporum* f.sp.*Lactuceae*

Rezisztencia – egy növény fajtának azon képessége, hogy korlátozni tudja egy konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését és/illetve azt a kárt, amelyet azok okoznak érzékeny fajtákhoz képest, hasonló környezeti feltételek és hasonló kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett.

Az ellenálló fajtákat megjelenhetnek bizonyos betegség tünetek, károk erős kártevő-, illetve kórokozó – nyomás mellett.

A rezisztenciának két szintje van:

High resistance (HR) - magas fokú rezisztencia nagymértékben korlátozza a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajták is megjelenhetnek bizonyos tünetek, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás esetén.

Intermediate resistance (IR) - mérsékelt rezisztencia korlátozza a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a tünetek, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérsékelt rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos tünetek, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.

A saláta peronoszpóra (*Bremia lactucae*) jelölése egységesen változott, ezentúl a BI: 29EU és az annál magasabb ellenállóság szint kerül jelölésre.



Örömmel jelentjük be,
hogy elkészült az

ÚJ WEBOLDALUNK!

Friss és modern designnal, könnyen áttekinthető felülettel várjuk látogatóinkat. Reméljük, hogy az új oldalunk segítségével még könnyebben és gyorsabban találják meg azokat a szakmai információkat, amelyekre szükségük van.

Olvassa be
a QR-kódot!



Köszönjük, hogy velünk tartanak!

www.syngentavegetables.com/hu-hu



Salátatermesztés Malagrow technológiával

A saláta termesztése során fontos a levélzet egészségi állapotának, kondíciójának magas szinten tartása. A kielégítő tápanyag-ellátás kritikus fontosságú. Rendelkezésre kell álljon a nagy zöldfelület neveléséhez szükséges magas nitrogén mennyiség, amit a szezon során több részletben, hatékony módon szükséges kijuttatni. A **Master öntöző műtrágya** család, a **Plantafo**l **lombtrágya** család és a nagy hatékonyságú **Brexil mikroelem műtrágya** család teljes megoldást nyújt a saláta tápanyagellátásához. A talajban található tápanyagok felvételében segít az **Activawave gyökérstimulátor**, melynek hatására a talajoldatban lévő tápanyagok gyorsan, hatékonyan felvehetővé válnak.

A lomb vízpotenciálja, sérüléstől való mentessége kulcsfontosságú, mert a vékony, puha szövetű levél sérülékeny, külső hatásokra érzékenyen reagál. A tenyészidőszak során a **Megafo**l **stresszkezelő** és a **Kendal szöveti ellenállóság növelő biostimulátorok** támogatják a növényeket az egészséges fejek növelésében. A kemény, pultálló és piacos saláták előállításakor kiemelkedő fontosságú a levelek megfelelő borulása, csavarodása, hogy megfelelő tömötséget elérjék. A **Benefit PZ** és **MC Cream** készítmények hatására fokozódik a fejet képző levelek fejlődése, csavarodása és egy **tömött, piacos, pultálló termés** alakul ki.

A **Malagrow zöldségtermesztési technológiái** nem csupán tápanyag-alapú receptek, hanem a növény fejlődésének és a környezeti hatásoknak megfelelő komplex tápanyagra és biostimulációra alapozott megoldások a nagyobb mennyiségű és jobb minőségű termés elérése érdekében.

Malagrow salátatermesztési technológia

Időzítés	Tápoldatozás		Lombtrágyázás	
	Készítmények	Elérendő cél	Készítmények	Elérendő cél
Palántázás, palánták bemártása	Master 13.40.13 (10 dkg/100 l) Radifarm (5 dl/100 l)	Gyökeresedés fokozása		
Palántázás, palánták beöntözése a területen (2 alkalommal, 7 naponta)	Master 13.40.13 (2,5 kg/1000 m ²) Radifarm (0,5 l/1000 m ²)	Gyökeresedés fokozása	Megafo l (3 dl/100 l) Kendal (3 dl/100 l)	Hideg időjárásban a tápanyagfelvétel gyorsítása, stresszhatások káros következményeinek csökkentése
Vegetatív növekedés	Master 20.5.10 (1,5-2 kg/1000 m ²) Viva (2-3 l/1000 m ²)	Lombnövekedés, intenzív tápanyagfelvétel	Megafo l (3 dl/100 l) Kendal (3 dl/100 l) Plantafo l 20.20.20 (30 dkg/100 l) 3-4 alkalommal	Kondicionálás, ellenálló képesség fokozása, stresszhatások kikapcsolása
Fejese	Master 20.20.20 (2-3 kg/1000 m ²) Viva (2-3 l/1000 m ²)	Egységes növekedés, intenzív tápanyagfelvétel	Benefit PZ (3 dl/100 l)	Koraiság fokozása, fejméret növelése
Fejese	Master 20.20.20 (2-3 kg/1000 m ²) Activawave (1-1,5 l/1000 m ²)	Tömör fejszerkezet	Brexil Mix (20-25 dkg/100 l) Calbit C (2-3 dl/100 l)"	Fejkeményesség növelése, mikroelem-utánpótlás
Fejese vége	Master 15.5.30+2 (2-3 kg/1000 m ²)	Tárolhatóság javítása	Plantafo l 5.15.45 (30-40 dkg/100 l) Calbit C (2-3 dl/100 l)	Piacos méret elérése
Növényvédelem hatékonyságának növelése: Control DMP 30-200 ml/100 l permetlé (dózisa a víz minőségétől függően változhat)				

TUDÁSSAL TÁPLÁLJA NÖVÉNYEIT



SALÁTAFÉLÉK NÖVÉNYVÉDELME

Hernyókártevők elleni védelem



Hatóanyag: emamektin-benzoát

Dózis: Fejes saláta (szabadföldi):
1,5-2,0 kg/ha

A Syngenta rovarölő készítménye, az Affirm hatékony megoldást jelent a hernyókártevők ellen és kulcsfontosságú a rovarölő szerekkel szemben kialakuló rezisztencia elkerülésében.

A kezeléseket a kártevő imágóinak feromoncsapdás rajzásmegfigyelése alapján a tömeges lárvakeléshez kell igazítani, és ezt követően érdemes 7-10 naponként megismételni. Az emamektin-benzoát egy lokálisan felszívódó gyomorméreg, de kijuttatásakor oda kell figyelni a megfelelő fedettségre. A készítmény hatékonyságán túlmenően **rövid élemezés-egészségügyi várakozási idővel** rendelkezik: salátában 3 nap. Felhasználható szabadföldi fejes saláta kultúrában gyapottok-bagolylepke ellen.

Levéltetvek és hernyókártevők elleni védelem



Hatóanyag: lambda-cihalotrin

Dózis: Saláta: 0,125 l/ha; Rukkola,
galambbegy saláta: 0,2-0,25 l/ha

A salátafélék rovarkártevői elleni védekezésben hatékony segítséget nyújt a Karate Zeon 5 CS. A Karate Zeon 5 CS a bagolylepke folyamatosan kelő, fiatal hernyói, valamint a levéltetvek ellen is jól használható.

A készítményt a levéltetvek első telepeinek megjelenésekor ajánlott kijuttatni. A felszaporodás mértékétől függően 12-14 nap múlva célszerű megismételni a kezelést. Egy tenyészidőszakban legfeljebb kétszer alkalmazható. Felhasználható fejes saláta, rukkola és galambbegy saláta kultúrákban.

SALÁTAFÉLÉK NÖVÉNYVÉDELME

Gombabetegségek elleni védelem



Hatóanyag: azoxistrobin

Dózis: Fejes saláta,
endívia, rukkola: 0,75-1 l/ha

Az Amistar hatóanyaga az azoxistrobin az egyik leg szélesebb gombaölő spektrummal rendelkező anyag. E mellett pozitív élettani hatással is jellemezhető, úgynevezett „zöldítő hatással”, ami pozitívan befolyásolja a termés minőségét és mennyiségét.

Gyorsan felszívódik a növényben és a gomba légzését gátolva kiváló védelmet nyújt a saláta peronoszpórák és rizoktóniás betegségével szemben. A kezeléseket megelőző, preventív módon célszerű elkezdni, a fertőzési nyomás erősségétől függően 7-10 napos permetezési fordulókat tartva. Felhasználható saláta, endívia és rukkola kultúrákban **peronoszpóra és rizoktónia ellen.**



Hatóanyag: azoxistrobin, difenokonazol

Dózis: Fejes saláta, rukkola: 0,8-1 l/ha

A két, egymástól eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó készítmény megfelelő védelmet nyújt a salátaféléket károsító gombabetegségek ellen.

Az **Amistar Top** a saláta és rukkola 6 leves állapotától egészen a végső levéltömeg eléréséig kijuttatható. Egy tenyészidőben 7 napos időközzel, legfeljebb kétszer alkalmazható. Felhasználható salátafélék közül fejes saláta és rukkola kultúrákban **peronoszpóra, szürkepenész és fehérpenész ellen.**



SALÁTAFÉLÉK NÖVÉNYVÉDELME



Hatóanyag: oxatiapiprolin, mandipropamid
Dózis: Fejes saláta: 0,25-0,4 l/ha
 (2024-es évtől lesz elérhető)

Az **Orondis Ultra** készítmény egy peronoszpórás betegségek ellen speciálisan összeállított gyári kombináció. Egyik hatóanyaga az oxatiapiprolin egy új hatásmechanizmusú anyag, a kórokozó lipid bioszintézisét, valamint egyes jelátviteli folyamatait gátolja.

Nagyon alacsony dózisban is kiváló hatékonyságú, a levél szövetébe is beszívódik, de jelentős része a viaszrétegben koncentrálódik, ennek köszönhető kiemelkedő preventív hatása. A mellette lévő mandipropamid egy jól ismert cellulóz bioszintézis gátló anyag, mely kiemelkedő preventív és kismértékű kurratív hatással is rendelkezik. A hatóanyagok erősítik egymást, együttesen hosszú hatástartammal jellemezhetők és a kórokozó minden fejlődési alakja ellen hatnak.



Hatóanyag: mandipropamid, difenokonazol
Dózis: Fejes saláta, endíviasaláta, cikóriasaláta: 0,5 l/ha

A **Revus Top** a hatóanyag összetételének köszönhetően mind a peronoszpórafélék, mind a levélfoltosságok ellen kiváló hatékonysággal rendelkezik.

Mandipropamid hatóanyaga kifejezetten az oospórás gombák ellen hat, melyek közé a salátaperonoszpóra is tartozik. A sejtfal képződését gátolja, így megakadályozza a spórák csírázását és a gombafonalak növekedését. Ennek eredményeképp már azt megakadályozza, hogy a gomba behatoljon a növénybe, így nem alakul ki gazdasági kár. A mellette megtalálható difenokonazol pedig hatékonyan gátolja a különböző levélbetegségek így a saláta marszonínás betegségnek életfolyamatait is.



Hatóanyag: Bacillus amyloliquefaciens FZB24
Dózis: Fejes saláta: 0,185-0,37 kg/ha

A **Taegro** egy ökológiai gazdálkodásban is felhasználható biológiai gombaölőszert. Hatását három módon fejti ki, a növény felszínén felszaporodva gátolja

a kórokozó behatolását, másodsorban olyan anyagokat termel, amik gátolják a gombák tovább fejlődését, harmadsorban a növény ellenálló képességét belülről erősíti. A baktérium jó alkalmazkodó képességű széles pH-n és hőmérsékleten stabil, azonban az UV-ra érzékeny! További kiemelkedő tulajdonsága, hogy jól keverhető, még rézzel és kénnel is! Hajtatott fejes salátában alkalmazható salátaperonoszpóra ellen.



Hatóanyag: fludioxonil, ciprodinil
Dózis: Fejes saláta, endívia, rukkola: 0,6 kg/ha

A saláta egyik legrégebben ismert, gyakori betegsége a szürkerothadás. Elsősorban a hajtatott salátán fordul elő. **A Switch 62,5 WG két igen nagy hatékonyságú, felszívódó hatóanyaga** jelentős

gyógyító hatással is rendelkezik, ennek köszönhetően egy kezdeti fertőzést még képes lehet blokkolni. Salátában, endíviában és rukkolában a permetezést a palánták tápkockába tűzdelése, valamint kiültetése után közvetlenül, majd 10 nap múlva célszerű végezni nagy lémenyiséggel, hajtatásban: 800-1200 l/ha, szabadföldön: 400-600 l/ha. Egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal szabad felhasználni. Felhasználható fejes saláta, endívia és rukkola kultúrákban **szürkepenész és fehérpenész ellen.**

Biostimulátorok



(2024-es évtől lesz elérhető)

Biostimulátor speciálisan kertészeti kultúrákra kifejlesztve!

Állati eredetű biostimuláns, mely szabad aminosavakat, valamint hosszú- és rövid szénláncú peptidokat tartalmaz. A mellett, hogy nitrogén tartalma magas, rendkívül nagy tisztaságú, nátrium és klorid tartalma igen alacsony. Ez kiemelkedően fontos a sóérzékeny kertészeti kultúráknál.

Hatása összetett, alkotóelemei a növény életani folyamatait pozitív irányba befolyásolják. Ennek köszönhetően minimalizálja az abiotikus stresszek okozta károkat, stimulálja a hajtás- és gyökér növekedést. Ezek a folyamatok végeredményképp koncentráltabb termésérést és jobb beltartalmi értékeket eredményeznek.

Salátafélékben használata 2 l/ha-os dózissal ajánlott, minimum 400 l-es vízmennyiséggel.

AZ ELSŐ BIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY


Syngenta portfóliójában
kertészeti kultúrákban
a **GOMBÁS BETEGSÉGEK ELLEN**

A Taegro a Syngenta első biológiai növényvédő készítménye, amely a *Bacillus amyloliquefaciens* baktérium egy speciális törzsét tartalmazza. Megelőző kijuttatással gombák széles köre ellen hatékony.

Élelmiszebiztonságügyi várakozási ideje 1 nap, és engedélyezett ökológiai gazdálkodásban is!

Hogyan működik a Taegro?

A Taegro a permetező tartályába kerülve azonnal szaporodásnak indul és a koncentrációja exponenciálisan növekszik. A szaporodásnak köszönhetően sejtláncokat hoz létre, ami sok százezer sejt összekapcsolódását jelenti. Lombfelületre permetezve fejti ki növényvédő hatását.



Hogy fejti ki a hatását?

A Taegro háromféle módon képes kifejteni gombaölő hatását.

- Kompetíció a levélfelszínen**

A kórokozó gomba nem képes megtapadni a növény felületén
- Metabolitok kiválasztása a szövetekben**


A metabolitok gátolják a gombák továbbfejlődését
- A növény természetes ellenálló képességének fokozása**

Belülről erősítve a növényt, csökkenti a kórokozókra való fogékonyságot

A Taegro legfontosabb jellemzői:

- Kiemelkedő hatékonyság a hasonló készítményekhez képest.
- Kifejezetten megelőző jelleggel javasolt.
- Nem csak biológiai, de a konvencionális program kiegészítéseként is alkalmazható.
- Jó keverhetőség
- Biológiai készítmények között kiemelkedő pH és hőmérséklet stabilitás
- Tárolása nem igényel speciális körülményeket

Syngenta Növényvédelmi technológia SALÁTÁBAN



- Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
- A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják, nem alkalmazható! 2023. február 22. után kizárólag szabadföldi salátában alkalmazható

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kapcsolat

Leveles zöldségek és hagymafélék specialista

Fóris Balázs: 06 20 826-6785

balazs.foris@syngenta.com

Káposzta és salátafélék termékmenedzser:

Rádi László Zsolt: 06 20 579-6495

laszlo_zsolt.radi@syngenta.com

Zöldségvetőmag Ügyfélszolgálat :

Telefon: (06 1) 488 2211, (06 1) 488 2236

Fax: (06 1) 488 2259

zoldseg.ugyfelszolgalat@syngenta.com

Marketing vezető:

Gáncse Mihály: 06 20 936-2138

mihaly.gancse@syngenta.com

Zöldségfélék üzletágvezető:

Antal Gyula: 06 20 561-8865

gyula.antal@syngenta.com

Dinnye, uborka, tökfélék és fűtetlen hajtatási specialista:

Lacházi Pál: 06 20 978-0548

pal.lachazi@syngenta.com

**syngenta**

Syngenta Kft.

1117 Budapest, Alíz u. 2.

Telefon: 06 1 488-2200

info.hungary@syngenta.com

www.syngenta.hu

 syngentaagrarklub

 syngenta_magyarország